©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Nachr. ent. Ver. Apollo, Frankfurt, N. F. Bd. 4, Heft 3: 71–80 – Januar 1984

Ergebnisse einer Sammelreise durch Nordgriechenland und Anatolien (Lepidoptera: Noctuidae)

von

GOTTFRIED BEHOUNEK

Einleitung

Die Reise fand in der Zeit vom 20. Mai bis 19. Juni 1982 zusammen mit Herrn A. FLUNGER/Lenggries statt und führte uns quer durch Jugoslawien, Nordgriechenland und Anatolien bis Adana.

Die ursprüngliche Absicht, hauptsächlich in den höheren Lagen des Taurusgebirges zu sammeln, mußte leider fallengelassen werden, da es hier täglich am späten Nachmittag zu schweren Regenfällen kam, die bis spät in die Nacht anhielten. Wir waren daher gezwungen, meistens in die tieferen Lagen am Südhang des Taurus, zum Mittelmeer hin, auszuweichen. Es konnte lediglich einmal oberhalb 1200 m geleuchtet werden. Auf der ganzen Reise wurde annähernd täglich der Sammelplatz gewechselt, wobei auch unterschiedliche Biotope gewählt wurden. So wechselten sich Trocken- und Feuchtbiotope ständig ab, und es konnte eine relativ große Artenzahl an Schmetterlingen erbeutet werden. Da ich mich ausschließlich mit der Familie der Noctuidae befasse, werden in der anschließenden Artenliste auch nur diese behandelt. Die sonst noch gesammelten Tiere wurden an befreundete Sammler abgegeben. Pieridae und Lycaenidae an Herrn de FREINA/München, Bombyces an Herrn WITT/München, Geometridae an Herrn Dipl.-Ing. PINKER/Wien, Coleoptera an Herrn WACHTEL/Wolfratshausen, Diptera und Hymenoptera befinden sich bei Herrn SCHACHT/München.

Reiseroute und Fundortverzeichnis

Die Reiseroute mit den numerierten Sammelplätzen ist auf der Kartenskizze ersichtlich. Die Fundorte sind:

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at



Abb. 1: Kartenskizze der Reiseroute mit Angabe der Sammelorte. Nummernerklärung siehe im Text.

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

1.	Jugoslawien	Mazedonien, Umg. Titov. Veles, 200 m, 21.5.1982
2.	Griechenland	Makedonien, Disron-Gebirge, 200 m, Umg. Kilkis, 21.5.1982
3.	Griechenland	Makedonien, Disron-Gebrige, 300 m, Umg. Terpilos, 22.5.1982
4.	Griechenland	Makedonien, Disron-Gebirge, 300 m, Umg. Pontokerassea, 22.5.1982
5.	Griechenland	Makedonien, Menikion-Gebirge, 650 m, Umg. Nea Zihni, 23.5.1982
6.	Griechenland	Thrakien, Rhodopen-Gebirge, 200 m, Umg. Kirki, 24.5.1982
7.	Türkei, Europa	Halbinsel Gelibolu, Umg. Galata, 20 m, 25.5.1982
8.	Türkei, As. min.	Bakir-Tal, 150 m, Umg. Bergama, 26.5.1982
9.	entfällt	
10.	Türkei, As. min.	Anatolien, Koca-Dagh, 650 m, Umg. Kula/Yenişehir, 27.5.1982
11.	Türkei, As. min.	Umg. Afyon, Hamam, 1050 m, 28.5.1982
12.	Türkei, As. min.	Sultan-Dagh, 1150 m, Umg. Bagkonak, 29.5.1982
13.	Türkei, As. min.	Beyşehir Gölü, Umg. Beyşehir, 1100 m, 29.5.1982
14.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Umg. Eregli, Ifriz, 1200 m, 30.5.1982
15.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Umg. Pozantı, 1200 m, 1.6.1982
16.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, 20 km nördl. Tarsus, Umg. Siraköy, 100 m, 1.6.1982
17.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Umg. Erdemli, 150 m, 2.6.1982
18.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, 25 km nördl. Silifke, Umg. Kargican, 100 m, 3.6.1982
19.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Servatul-Paß, 1600 m, 5.6.1982
20.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, 15 km südl. Gülnar, 650 m, 5.6.1982
21.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Umg. Alanya, 100 m, 6.6.1982
22.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Umg. Tokratepe, 450 m, 7.6.1982
23.	Türkei, As. min.	Taurus-Gebirge, Celtikci-Paß, 1200 m, 8.6.1982
24.	Türkei, As. min.	Anatolien, Umg. Sandikli, 1100 m, 9.6.1982
25.	Türkei, As. min.	Anatolien, Umg. Banaz, 1000 m, 9.6.1982
26.	Türkei, As. min.	Anatolien, Umg. Simav, 850 m, 10.6.1982
27.	Türkei, As. min.	Anatolien, Umg. Ivrindi, 250 m, 11.6.1982
28.	Türkei, Europa	Halbinsel Gelibolu, Umg. Ulgarderekoy, 40 m, 12.6.1982
29.	Griechenland	Thrakien, Rhodopen-Gebirge, 200 m, Umg. Kirki, 13.6.1982
30.	Griechenland	Makedonien, Menikion-Gebirge, 500 m, Umg. Kehrakambos, 14.6.1982
31.	Griechenland	Makedonien, Menikion-Gebirge, 650 m, Umg. Agriani, 15.6.1982
32.	Griechenland	Makedonien, Disron-Gebirge, 100 m, Umg. Terpilos,

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

16.6.1982

33. Jugoslawien Mazedonien, Umg. Titov Veles, 200 m, 17.6.1982

Systematischer Teil, Artenliste Noctuidae mit Fundortangaben

AGROTINAE

Euxoa eruta HB.	10
Agrotis cinerea SCHIFF.	30
exclamationis L.	2, 5, 11, 13, 14, 23, 26
segetum SCHIFF.	5, 6, 7, 11, 16, 20, 24, 26
ipsilon HUFN.	13, 31
spinifera HB.	2, 3, 7, 16, 21
ripae wagneri CTI.	14, 23
Ochropleura plecta L.	13, 30
leucogaster FRR.	16
flavina H.S.	25
Parexarnis sollers STGR.	13, 14
Ygogia forcipula SCHIFF.	20, durch Gen.-Präp. gesichert
amasina TTI.	20, durch Gen.-Präp. gesichert
Dichagyris erubescens STGR.	14, 20
Noctua comes HB.	20, 22, 27, 31, 32
orbona HUFN.	6, 25, 26
janthina SCHIFF.	20
Peridroma saucia HB.	10, 13, 20, 22

HELIOTHIDINAE

Pyrrhia umbra HB.	2
Chloridea peltigera SCHIFF.	11, 16, 21, 22
maritima GRASL.	2, 4, 6, 10, 14, 24
nubigera H.S.	11, 16, 17, 18, 22
Periphanes delphinii L.	11, 25
treitscke FRIV.	22
Rhodocleptria incarnata FRR.	4, 10, 11, 14

HADENINAE

Discestra mendax STGR.	11, 13, 14, 20, 25, 31
trifolii HUFN.	2, 4, 6, 7, 13, 25, 32
sociabilis GRASL.	13
Lacanobia w-latinum HUFN.	5, 11, 13, 26, 30
oleracea L.	4, 5, 26

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Mamestra bicolorata HUFN. 2, 11, 14, 30
dysodea SCHIFF. 13, 23, 25
Hadena perdentata HMP. 11
syriaca OSTH. 14, 16
variegata WAGN. 14
pumila STGR. 14
lepida STGR. 2, 4
silenes HB. 2, 4, 5, 7
magnolii BSD. 11, 17
filigrama ESP. 5
tephroleuca asiatica DRDT. 26
loudeti BSD. 32
Mythimna l-album L. 18, 20, 28
congrua HB. 16, 28, 29, 32
albipuncta SCHIFF. 2, 4, 6, 30
sicula TR. 2, 4, 5, 6, 7, 29
alopecuri BSD. 6
vitellina HB. 2, 4, 6, 7, 14
pallens L. 13
consanguis GN. 18, 20
Pseudoleucanis unipuncta HW. 16, 21
Acantholeucania loreyi DUP. 13, 17, 18, 20

CUCULLINAE

Cucullia umbratica L. 30
barthae BRSN. 25, 27
thapsiphaga TR. 14, 27
verbasci L. 14
Calophasia hamifera STGR. 27, 28
barthae WAGN. 14, 23
casta BKH. 14
freyeri FRIV. 14
almoravida GRASL. 23
Cleophana olivina H.S. 2, 4, 14, 30
oliva STGR. 14
acuta FRR. 14
opposita LED. 11, 14
Omphalophana anthirrhini HB. 11, 14, 23, 27, 28
Amephana dalmatica RBL. 2, 4, 5, 28, 29
anatolica LED. 2, 7, 10, 14
Recoropha beata STGR. 14
Lamprosticta culta SCHIFF. 4, 14

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

ACRONICTINAE

Subacronicta megacephala SCHIFF.	2, 4, 11, 26
Acronicta aceris L.	4, 6, 21, 28
psi L.	3, 5, 6, 7, 11, 13, 26, 27, 28, 32
tridens SCHIFF.	2, 23, durch Gen.-Präp. gesichert
orientalis MÉN.	3, 23
euphorbiae SCHIFF.	5
rumicis L.	2, 7, 13, 16, 21, 26, 32

BRYOPHILINAE

Cryphia maeonis sabulosa WARR.	18
tephrocharis BRSN.	17, 18
Bryoleuca petrea contristans LED.	18, 20

AMPHIPYRINAE

Autophila subfusca CHRIST.	18
Pyrois effusa BSD.	21
Amphipyra tragopoginis CL.	16
Callopistria juventina CR.	21
latreillei DUP.	30
Polyphaenis sericata ESP.	17, 21, 22
Phlogophora meticulosa L.	6, 26
Dicycla oo L.	27, 29
Enargia ypsillon SCHIFF.	32
Actinotia hyperici SCHIFF.	4, 7, 18, 22, 26
Apamea monoglypha HUFN.	6, 10
syriaca OSTH.	22, 26 Ich behalte z.Zt. noch *syriaca* OSTH. bei, obwohl es sichersteht, daß *sicula* TTI., *syriaca* OSTH. und *tallosi* KOVACS & VARGA konspezifisch sind. *Sicula* TTI. wäre prioritätsberechtigt.
lithoxylea SCHIFF.	10
anceps SCHIFF.	2, 5
sordens HUFN.	14
Rusina ferruginea ESP.	30
Charanyca trigrammica HUFN.	2, 4, 5, 6, 11, 26
Oligia latruncula SCHIFF.	7, 13, 26, 30
strigilis L.	30

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Hoplodrina blanda SCHIFF. 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32
ambigua SCHIFF. 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32
pfeifferi BRSN. 26
respersa SCHIFF. 30
Spodoptera exigua HB. 13, 17, 18, 21, 22
Paradrina clavipalpis SCOP. 2, 7
Atypa pulmonaris ESP. 29, 30
Athetis hospes FRR. 32
Oria musculosa HB. 8, 16, 18, 20
Sesamia nonagrioides LED. 16
Hadjina viscosa FRR. 17, 18
Megalodes eximia FRR. 8

ACONTIINAE

Metachristis dardouini BSD. 27
velocior STGR. 17, 18
Rhypalaga lacernaria HB. 14, 18
Eublemma purpurina SCHIFF. 6, 26, 31, 32
ostrina HB. 14, 16, 18
parva HB. 17, 18
vridula GN. 17, 18
respersa HB. 10
ragusana FRR. 17, 18
polygramma DUP. 14, 18
Lithacodia pygarga HUFN. 31, 32
Emmelia trabealis SCOP. 10, 16, 27
Acontia lucida HUFN. 4, 6, 7, 8, 18, 21, 32
urania FRIV. 17

PANTHEINAE

Colocasia coryli L. 5

STICTOPTERINAE

Zezeeba falsalis H.S. 28

EUTELINAE

Eutelia adulatrix HB. 6, 17, 18, 20, 21, 22, 28
adoratrix STGR. 18, 21

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

NYCTEOLINAE

Nycteola asiatica KRUL. 32

HYLOPHILINAE

Earias chlorana L. 4, 6, 13, 17, 18, 26, 27, 29
Pseudoips bicolorana FUESSL. 6, 17

PLUSIINAE

Chrysodeixes chalcytes ESP. 17, 21
Trichoplusia ni HB. 10, 13, 14, 18, 20, 22
circumscripta ESP. 16, 18, 21
Macdunnoughia confusa STEPH. 32
Plusia chrysitis L. 2
Argyrogramma accentifera LEF. 18, 21
Euchalcia phrygiae DUF. 14
emichi RGHFR. 14
Autographa gamma L. 8, 21, 31
circumflexa L. 10, 11, 16

CATOCALINAE

Catocala disjuncta HB. G. 17, 18
eutychea TR. 16, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 31
Minucia lunaris SCHIFF. 5, 7, 25
syriaca BUGN. 7, 18
Dysgonia algira L. 2, 4, 10, 18, 20, 22, 27, 28, 29
Grammodes stolida F. 4, 10, 17, 18, 22
Pericyma albidentaria FRR. 18
Euclidia mi CL. 4

OPHIDERINAE

Aleucanitis cailino LEF. 18
Anophia leucomelas L. 17, 21
Catephia alchymista SCHIFF. 27
Tytia luctuosa SCHIFF. 2, 7, 14, 16, 27
Exophila rectangularis HB. 11
Phytometra viridaria CL. 28
Colobochyla salicalis SCHIFF. 32

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Laspeyria flexula SCHIFF. 25, 27
Zethes insularis RBR. 17, 28

HYPENINAE

Polypogon plumigeralis HB. 28
Hypena ravalis H.S. 14
Rhynchodontodes antiqualis HB. 6, 17, 18, 25, 28, 29
Schrankia orientalis STGR. 17

Literatur

BATTENFELD, P. (1978): Sammelergebnisse aus Ankara. – Nachr. ent. Ver. Apollo (Alte Folge) **3** (2–4): 44–47.
BOURSIN, C. (1933): Neue *Cucullia* und *Athetis* von Marasch in türkisch Nordsyrien. – Mitt. Münch. Ent. Ges. **23** (1): 8–26.
– – – (1952): Zwei neue *Cryphia* HB.-Arten aus dem vorderasiatisch-mediterrannen Faunenkreis. – Z. Wien. ent. Ges. **37**: 152–155.
– – – (1953): Eine neue Gattung der Unterfamilie Agrotinae aus dem vorderasiatisch-mediterranen Faunenkreis. – Z. Wien. ent. Ges. **38**: 212–217.
– – – (1954): Zwei neue *Cryphia* HB.-Arten aus dem vorderasiatisch-mediterranen Faunenkreis. – Z. Wien. ent. Ges. **39**: 85–89.
– – – (1967): Eine neue *Mythimna* O. aus Ostanatolien. – Z. Wien. ent. Ges. **53**: 90–91.
HERING, M. (1933): Weitere Noctuiden und Geometriden von Ankara. – Int. Ent. Z. **26**: 411–415.
KOÇAK, Ö. (1975): New Lepidoptera from Turkey, II. – Atalanta **6** (1): 50.
– – – (1977): New Lepidoptera from Turkey, V. – Atalanta **8** (2): 126–147.
OSTHELDER, L. (1932): Lepidopterenfauna von Marasch in Nordsyrien. – Mitt. Münch. Ent. Ges. **22** (2): 83–87.
– – – (1940): Lepidopterenfauna von Marasch in türkisch-Nordsyrien. – Mitt. Münch. Ent. Ges. **30**: 107–111.
PINKER, R. (1972/74): Zwei neue Noctuen aus Kleinasien. – Z. Arbgem. Österr. Ent. **24** (3): 111–112.
REBEL, H. (1930): Lepidopteren aus der Umgebung von Ankara. – Ann. naturhist. Mus. Wien, Jg. 1930: 1–10.
SCHWINGENSCHUSS, L. (1938): Sechster Beitrag zur Lepidopterenfauna Inner-Anatoliens. – Ent. Rdsch. **55**: 141.
– – – (1939): Kleiner Beitrag zur Fauna der Umgebung Erzurums in Kleinasien. – Z. Österr. Ent. Ver. **27**: 97–100.

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

VARGA, Z. (1975a): Eine Noctuidenausbeute aus Anatolien. – Ent. Z. **85** (15): 172–174.
– – – (1975b): Neue Noctuiden aus der Sammlung VARTIAN, 1. – Z. Arbgem. Österr. Ent. **27** (1–2): 1–14.
WAGNER, F. (1929): Ein weiterer Beitrag zur Lepidopterenfauna Inner-Anatoliens. – Mitt. Münch. Ent. Ges. **19** (2–4): 68–80.
– – – (1931): Vierter (V.) Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Inner-Anatoliens. – Int. Ent. Z. **25** (47): 467–484; **26** (13–18): 139–187.
ZUKOWSKY, B. (1938): Reisebericht über entomologische Aufsammlungen im nordöstlichen Anatolien (westliches Armenien) 1934. – Ent. Rdsch. **55** (3–4): 27–30.

Anschrift des Verfassers:

GOTTFRIED BEHOUNEK, Jägerstraße 4a, D-8024 Deisenhofen.

BITTE UM MITARBEIT

Für wissenschaftliche Untersuchungen in den Netzflüglerfamilien Ascalaphidae (Schmetterlingshafte) und Nemopteridae (Fadenhafte) (Neuroptera: Planipennia) suche ich ständig Informationen über die Tiere sowie Material. Für Zuschriften aus dem Leserkreis bin ich jederzeit dankbar.

Prof. Mag. EYJOLF AISTLEITNER, Kapellenweg 37/1, A-6806 Feldkirch, Österreich.